

Asocierea evențațiilor cu comorbiditățile preexistente ca factori de risc

M. Akinci, K.B. Yilmaz, B. Kulah, G.E. Seker, C. Ugurlu, H. Kulacoglu

Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Rezumat

Generalități: Comparativ cu alte tipuri de hernii, evențațiile abdominale sunt mult mai des asociate cu comorbidități. Analizăm ipoteza că factorii locali nefavorabili legați de comorbidități pot predispuce la formarea de evențații.

Materiale și metodă: Caracteristicile evențațiilor (71 de pacienți), herniilor abdominale primare (114 pacienți) și grupurilor de hernii inghinale (820 de pacienți) au fost analizate și comparate între ele.

Rezultate: Vârsta avansată, sexul feminin, prezența unor boli preexistente, strangularea, încarcerarea, rezecțiile intestinale sau omentale, tromboza venoasă profundă, ileusul paralic, infecțiile lezionale sunt caracteristici prezente în procente mai mari în lotul de evențații comparativ cu celelalte grupuri, scorurile ASA fiind semnificativ crescute, la fel ca și perioadele de internare în cazul acestor pacienți. Prezența comorbidităților preexistente și scorurile de clase ASA au fost factori predictivi independenți ai perioadei de spitalizare în cazul pacienților cu evențații. ($p < 0,05$).

Concluzii: Evențațiile abdominale sunt asociate cu o incidență mai ridicată a bolilor comorbide comparativ cu alte tipuri de hernii de perete abdominal. Pacienții cu boli preexistente pot prezenta factori locali nefavorabili ce predispuce la formarea herniilor postincizionale.

Cuvinte cheie: evențație, comorbiditate, scor ASA, hernie inghinală, hernie abdominală primară

Correspondență:

Melih Akinci, MD

1424. Cadde 1435. Sokak 4/14 06511, Cukurambar/Ankara

E-mail: melihakinci@yahoo.com