

Studiu retrospectiv asupra managementului miniinvaziv al litiazei postoperatorii a căii biliare principale

B.A. Safta^{1,2}, M. Grigoriu^{1,3}, R. Palade^{1,3}, D. Ion^{2,3}, D.N. Păduraru^{2,3}, A. Bolocan^{2,3}

¹Ist Emergency General Surgery Clinic, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

²IIIrd Emergency General Surgery Clinic, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

³"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Litiaza postoperatorie a căii biliare principale (CBP) ocupă un loc însemnat în patologia bilio-pancreatică, atât prin frecvența mare, cât și prin problemele de diagnostic și tratament pe care le ridică.

Material și metodă: Bazându-ne pe o experiență, care s-a desfășurat într-o perioadă de cinci ani (2008-2012), evaluată retrospectiv, totalizând 51 de pacienți cu litiază postoperatorie a CBP, am încercat să formulăm câteva recomandări în tratamentul acestei patologii. Acestea au fost ghidate de opțiunile terapeutice alternative existente și de ideile vehiculate în literatura de specialitate, privind rezultatele înregistrate de fiecare manieră de tratament.

Rezultate: Rata de clearance a CBP a fost de 93,6%, morbiditatea de 10,65% și mortalitatea de 0%, acestea îndreptățindu-ne să apreciem eficiența tratamentului miniinvaziv, ca fiind maximă în tratamentul acestei patologii.

Concluzii: Tratamentul endoscopic al litiazei postoperatorii a CBP s-a dovedit a fi posibil, eficient și credem că este bine a se folosi de principiu, chirurgia deschisă rămânând rezervată doar eșecurilor sau contraindicațiilor tratamentului mini-invaziv.

Cuvinte cheie: litiază coledociană, ERCP, sfincterotomie endoscopică

Corresponding author: D.N. Păduraru, MD

Surgical Department III, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

E-mail: dan.paduraru.nicolae@gmail.com