

Complicații abdominale acute în chirurgia șoldului

B. Deleanu¹, R. Prejbeanu¹, D. Vermesan¹, H. Haragus¹, I. Icma², V. Predescu³

^{1st}Department of Orthopedics and Trauma, "Victor Babeș" University of Medicine and Pharmacy Timișoara, Romania

^{2st}Department of Surgery, "Victor Babeș" University of Medicine and Pharmacy Timișoara, Romania

^{3rd}"Sf. Pantelimon" Department of Orthopedics and Trauma, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

Rezumat

Chirurgia șoldului este una dintre cele mai frecvente și favorabile proceduri ortopedice. Deși rare, complicațiile abdominale apar și sunt asociate cu evoluție nefavorabilă. Am dorit să identificăm și să descriem complicațiile abdominale severe ce apar imediat postoperator la pacienții cu proceduri traumatice și elective ale șoldului. Analiza retrospectivă pe patru ani a bazei de date electronice a găsit 408 artroplastii primare de șold, 51 de revizie și 1040 de fracturi ale femurului proximal. Dintre aceștia, 3 bărbați și 4 femei cu vârsta între 64 și 84 de ani, au prezentat complicații abdominale la 3-10 zile de la operația ortopedică inițială: ulcer acut perforat (3), colacistită acută (2), volvulus (1), megacolon toxic cu peritonită (1) și ileus dinamic (1). Complicațiile abdominale perioperatorii sunt rar întâlnite în secțiile de ortopedie generală. Însă când apar, sunt aproape exclusiv la pacienți cu patologie de șold, targați și duc în evoluție la situații cu risc vital. Subliniem necesitatea ca aceste situații să fie rapid identificate atât de către chirurgii ortopezi cât și cei generaliști. Astfel se poate asigura un management eficient care să îmbunătățească siguranța pacienților.

Cuvinte cheie: artroplastie șold, fractură femur proximal, complicații perioperatorii, pseudo-ocluzie colonică, abdomen acut

Corresponding author: Haragus Horia, MD

^{1st} Clinic of Orthopedics and Trauma Emergency Clinical County Hospital

10 Iosif Bulbuca Blvd, 300736, Timișoara, Romania

E-mail: horia.haragus@yahoo.com