

Studiu clinic asupra flegmoanelor cervicale

C. Stan¹, C. Drăgulescu², N. Bacalbașa³

¹Ilfov County Hospital, ENT Department, Bucharest, Romania

²I.F.-A.C.F.-O.R.L. "Prof. Dr. D. Hociota" Bucharest, Romania

³"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a elabora un algoritm de diagnostic și tratament al flegmoanelor cervicale pentru a crește acuratețea diagnosticului și a scădea riscurile intra și postoperatorii, rata complicațiilor, precum și pentru a crește numărul cazurilor cu restitutio ad integrum. Studiul de față este unul clinic retrospectiv și a fost efectuat pe un lot de 21 de pacienți diagnosticați cu flegmon cervical. Lotul de studiu este format din pacienți cu celuloză flegmon latero și retrofaringian (18 cazuri, din care 2 prin efracție faringiană sau a esofagului cervical prin corp străin inclavat - os de pui și respectiv de pește - cu pneumo-mediastin), abces retrofaringian și mediastinal posttraumatic (1 caz), flegmon periamigdalial fuzat în spațiul parafaringian complicat cu hemoragie parafaringiană după drenajul spontan al colecției purulente (2 cazuri). Tratamentul a fost eminent chirurgical, dublat de tratament medicamentos antibiotic intravenos și a fost individualizat în funcție de particularitatea fiecărui caz: localizarea și extensia flegmonului, complicațiile apărute, durata de evoluție, mecanismele de producere, etiopatogenie, afecțiunile generale asociate, vârsta și nu în ultimul rând opțiunea pacientului.

Cuvinte cheie: flegmoane cervicale, tratament chirurgical

Corresponding author: Nicolae Bacalbașa, MD

no. 2, Dimitrie Racoviță Street, Bucharest, Romania

E-mail: nicolaebacalbasa@gmail.com