

Agenezia congenitală de venă cavă inferioară – cauză complexă de tromboză venoasă profundă

A. Bolocan^{1,2}, D. Ion^{1,2}, D.N. Ciocan¹, D.N. Păduraru^{1,2}

¹IIIrd Emergency General Surgery Department, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Agenezia de venă cavă inferioară este o malformație extrem de rară, de cele mai multe ori descoperită întâmplător. Lucrarea de față prezintă cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 41 de ani internat în Clinica de Chirurgie Generală III a Spitalului Universitar de Urgență București cu diagnosticul de sindrom posttrombotic la nivelul membrelor pelvine bilateral. Din antecedentele personale chirurgicale reținem că prima intervenție în sfera vasculară a fost efectuată la vârsta de 6 ani. Indicația a fost determinată de prezența varicelor hidrostatice voluminoase la nivelul membrelor inferioare bilateral, practicându-se crosectomie cu stripping al venelor safene mari bilateral. Până la internarea în clinica noastră, pacientul a suferit intervenții chirurgicale repetate pentru varice hidrostatice recidivate la nivelul membrelor inferioare. Pacientul a fost diagnosticat în serviciul clinicii noastre cu agenezie congenitală de venă cavă inferioară, evoluția fiind lent favorabilă, pacientul externându-se la 17 de zile de la internare. Prezentarea descrie particularitățile clinice, imagistice și terapeutice ale unui astfel de caz. Considerăm esențială pentru evoluția favorabilă a pacientului nostru decelarea imagistică precoce a anomaliei vasculare, identificarea factorilor procoagulanți asociați și îngrijirea minuțioasă a leziunilor locale.

Cuvinte cheie: agenezie de venă cavă inferioară, tromboză venoasă profundă, ulcer varicos

Corresponding author: Dan Nicolae Păduraru, MD

IIIrd Emergency General Surgery Department

Emergency University Hospital Bucharest, Romania

E-mail: dan.paduraru.nicolae@gmail.com