

Lipom glandă parotidă: o entitate neobișnuită

Dionysios Dellaportas¹, Dionysios S. Mantzos¹, Theodosios Theodosopoulos¹, Anteia Paraskeva², Ioannis Vassiliou¹

¹2nd Department of Surgery, Aretaieion Hospital, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

²Department of Anesthesiology, Aretaieion Hospital, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

Rezumat

Apariția lipoamelor la glanda parotidă este extrem de rară și imposibil de diferențiat clinic. Un caz de lipom este descris mai jos, tratat cu succes prin parotidectomie superficială. Pacient de 57 de ani, cu o formațiune bine definită, provenind probabil din parotida dreaptă, a fost admis pentru investigații în unitatea noastră; inițial i s-a făcut o ecografie, iar apoi un RMN. Ambele investigații imagistice au relevat o tumoră lipomatoasă benignă și pacientul a fost supus unei parotidectomii superficiale fără a exista complicații. Deși țesutul adipos este o componentă naturală a glandei parotide, apariția lipoamelor este neobișnuită. Incidența leziunilor glandei parotide în instituția noastră este de aproximativ 1% (0.6-4.4%), iar cel mai des întâlnit mecanism patofiziologic este traumatismul. Evaluarea imagistică tomografică este foarte precisă în diagnosticul preoperator și înfășișarea pacientului este indicația pentru intervenția chirurgicală. Alte simptome mai deosebite pot pune în pericol stabilirea corectă a diagnosticului de lipom la glanda parotidă. Ca de obicei, excizia chirurgicală trebuie să respecte amplasarea nervilor faciali și ramurile acestora.

Cuvinte cheie: glanda parotidă, lipom, parotidectomie superficială