

Leziuni papilare mamare

Erdem Karadeniz¹, Sukru Arslan¹, Müfide Nuran Akcay¹, Irmak Durur Subaşı², Elif Demirci³

¹Department of General Surgery, School of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

²Department of Radiology, School of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

³Department of Pathology, School of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

Rezumat

Introducere: Leziunile papilare mamare reprezintă un grup patologic eterogen și sunt caracterizate prin formațiuni dezvoltate la nivelul canalelor galactofore. Scopul acestui studiu a fost de a prezenta, ținând cont de datele existente în literatura, cazuri supuse mastectomiei parțiale ca urmare a prezenței unei formațiuni tumorale mamare, care au prezentat leziuni papilare la examinarea histopatologică.

Material-metode: Datele clinice și buletinele anatomopatologice a 42 de pacienți operați în clinica noastră în perioada 2006-2014, considerate a prezenta leziuni papilare la examenul anatomopatologic, au fost examinate retrospectiv. Pacienții au fost evaluați în funcție de vârstă, sex, acuze, localizarea leziunilor, tipul de operație efectuat, tipul histopatologic al leziunii, perioada de urmărire postoperatorie și leziunile descoperite în timpul urmăririi.

Rezultate: Biopsia excizională sub formă de mastectomie parțială s-a efectuat la 34 de pacienți, raportați ca prezentând leziuni papilare benigne în urma biopsiei aspirative pe ac fin efectuate. În cazul a 11 pacienți leziunile au fost marcate radiologic anterior operației. 33 de pacienți prezentând leziuni papilare benigne la biopsia excizională au fost urmăriți post-operator. Mastectomia radicală modificată a fost efectuată la un număr total de 9 pacienți, dintre care 1 pacient cu leziune papilară malignă la biopsia excizională și 8 pacienți cu leziune papilară malignă la biopsia aspirativă pe ac fin.

Concluzii: Diagnosticul histopatologic trebuie confirmat prin efectuarea unei biopsii excizionale cu rezultat definitiv la pacienții diagnosticați cu leziuni papilare benigne la biopsia aspirativă pe ac fin, iar urmărirea postoperatorie trebuie efectuată în mod riguros pentru leziunile maligne dezvoltate la pacienți detectați ca prezentând leziuni papilare benigne.

Cuvinte cheie: glandă mamară, papilar, malign, biopsie aspirativă pe ac fin