

### **Liposarcom dediferențiat mezocolon sigmoidian – caz clinic**

Silviu Constantinoiu<sup>1</sup>, Ion-Florin Achim<sup>1</sup>, Oana-Eliza Cretu<sup>2</sup>, Tatiana Dumitru<sup>2</sup>, Adrian Constantin<sup>1</sup>, Simona Enache<sup>3</sup>, Ioan Nicolae Mates<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>General and Esophageal Surgery Clinic, Center of Excellence in Esophageal Surgery, St Mary Clinical Hospital, Bucharest

<sup>2</sup>Faculty of Medicine, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

<sup>3</sup>Pathology Department, St Mary Clinical Hospital, Bucharest

### **Rezumat**

Liposarcomul dediferențiat este un tip particular de liposarcom ce conține o componentă bine diferențiată suprapusă cu arii de sarcom non-lipogenetic cu grad înalt de diferențiere despre care s-a crezut că apare după o evoluție de câțiva ani dintr-un liposarcom bine diferențiat. Liposarcomul dediferențiat se dezvoltă cel mai frecvent în spațiul retroperitoneal, în timp localizarea intraperitoneală este extrem de rară, doar șapte cazuri au fost raportate în literatura medicală. Mai mulți anatomopatologi recunosc că un număr mai mare de sarcoame intrabdominale slab diferențiate ar fi de fapt liposarcoame dediferențiate. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 73 de ani cunoscut cu multiple antecedente personale patologice cardiovasculare, accident vascular cerebral sechelar și o formațiune voluminoasă intrabdominală în evoluție de trei ani de zile. Acesta s-a prezentat în serviciul nostru acuzând dureri abdominale nesistemizate și tulburări de tranzit intestinal. Cu toate că aspectele clinice și imagistice erau sugestive pentru prezența unui GIST, examenul anatomopatologic a relevat diagnosticul de liposarcom dediferențiat.

**Cuvinte cheie:** liposarcom dediferențiat, mezocolon sigmoidian, formațiune tumorală abdominală