

Colectomia dreaptă single port: tehnică chirurgicală

Ionuț Vîlcea^{1,2}, Leon Maggiori², Traean Burcoș¹, Yves Panis²

¹Department of General Surgery, Colțea Clinical Hospital, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²Department of Colorectal Surgery, Beaujon Hospital, Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP), Clichy, France

Rezumat

Metoda laparoscopică single port a fost folosită pentru prima dată în 1999 pentru colecistectomie de către Bresadola. Peste un deceniu, în anul 2008, prima colectomie dreaptă single port a fost raportată de Bucher și alții într-un caz care implica un polip de colon ascendent (1,2). Evoluția continuă tehnologică permite prima colectomie dreaptă single port după 17 ani de la prima colectomie laparoscopică (1991) care a fost întâmpinată inițial cu reticență, iar apoi a căpătat un loc bine stabilit în arsenalul chirurgiei colorectale. (2). Accesul single port, ca și NOTES oferă comparativ cu procedura laparoscopică standard avantajul cosmetic, reducerea durerii postoperatorii și o durată de spitalizare mai scurtă iar ca dezavantaje am putea menționa o durată operatorie mai lungă datorată unei posibilități mai reduse de triangulație și viziune (3,4). Reducerea durerii postoperatorii la care se adaugă rezultate cosmetice bune fără creșterea semnificativă a complicațiilor postoperatorii demonstrate deja prin studii retrospective necesită confirmare prin studii randomizate avute în vedere de trial TRUE în Franța (5). Colectomia dreaptă single port poate fi realizată cu rezultate oncologice similare chirurgiei laparoscopice standard, având rezultate postoperatorii foarte bune din punct de vedere estetic și al durerii postoperatorii diminuate. (5,6,7).

Cuvinte cheie: cancer de colon, colectomie dreaptă, trocar single port, tehnică chirurgicală