

Atitudinea terapeutică în cancerul de rect stenoizant

Violeta Deaconescu^{1,2}, Eugen Brătucu^{2,3}, Bogdan Mastalier^{1,2}, Cristian Botezatu^{1,3},
Marian Marincaș^{2,3}

¹Department of General Surgery, Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

³Departament of General Surgery I, „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Oncology Institute, Bucharest, Romania

Rezumat

Elaborarea unui management al cancerului de rect urmărește stabilirea unui algoritm de diagnostic, strategia aplicării tratamentului chirurgical, strategia și răspunsul tratamentului neoadjuvant și adjuvant și metodele optime de evaluare a răspunsului la tratamentul specific. În încercarea de a urmări acest management, am studiat aspectele enumerate mai sus și am efectuat un studiu clinic retrospectiv, descriptiv și a cuprins analiza datelor obținute pe un lot selectat de 90 pacienți diagnosticați cu cancer de rect stenoizant, în intervalul ianuarie 2008 - decembrie 2012, tratați în cadrul Clinicii Chirurgie Generală I Institutului Oncologic București “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” și în cadrul Clinicii Chirurgie Generală a Spitalului Clinic Colentina și a avut ca scop analiza atitudinii terapeutice în cancerul de rect stenoizant. Alegerea actului operator, dar mai ales momentul aplicării radioterapiei pre-operator și postoperator, asociată sau nu cu chimioterapia concomitentă, a ținut cont de prezența stenozei (obstrucție completă sau incompletă) și de stadiul evolutiv loco-regional și la distanță al bolii.

Cuvinte cheie: cancer rect, complicație, strategie terapeutică