

Condilom acuminat gigant perineal (Tumora Buschke-Löwenstein): prezentare de caz

D.C. Badiu^{1,2}, C.A. Manea¹, M. Mandu², V. Chiperi², I.E. Marin², C. Mehedintu^{2,3}, C.C. Popa^{2,4}, O.I. David¹, E. Bratila², V.T. Grigorean^{1,2}

¹“Bagdasar-Arseni” Clinical Emergency Hospital, General Surgery Clinic, Bucharest, Romania

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

³“Nicolae Malaxa” Clinical Hospital, Obstetrics-Gynecology Clinic, Bucharest, Romania

⁴The Emergency Teaching Hospital of Bucharest, General Surgery Clinic, Bucharest, Romania

Rezumat

Condilomul acuminat gigant, cunoscut și sub numele de tumora Buschke-Löwenstein (BLT), reprezintă o afecțiune cu transmitere sexuală rar întâlnită. În același timp, condilomul acuminat produs de infecția cu HPV (Human Papilloma Virus) devine una dintre cele mai comune infecții transmise pe cale sexuală ce afectează regiunea perineală. În aceste situații, opțiunea terapeutică de prima intenție este excizia chirurgicală. Obiectivul acestui articol este de a prezenta un caz în care tumora a atins dimensiuni gigante, ce afectează calitatea vieții și de a accentua importanța unei intervenții chirurgicale largi, având în vedere rata ridicată de recurență și potențialul semnificativ de transformare malignă a BLT.

Cuvinte cheie: gigant, condilom, Buschke-Löwenstein, vulvo-anal, HPV, neglijat