

Profilul clinico-patologic și rezultatele chirurgicale în cazul pacienților cu tuberculoză intestinală supuși laparotomiei

Priyank Pathak, Shantanu Kumar Sahu, Saurabh Agrawal

Department of General Surgery, Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Rama Himalayan University, Post-Doiwala Dehradun, Uttarakhand, India

Rezumat

Tuberculoza este una dintre cele mai vechi boli ce afectează omenirea. Tuberculoza abdominală reprezintă o problemă de sănătate publică frecvent întâlnită în țări în curs de dezvoltare precum a noastră. Tuberculoza gastrointestinală implică adesea regiunea ileocecală. Chirurgia în cazul tuberculozei intestinale este necesară pentru a combate efectele dăunătoare ale bolii, de tipul dezorganizării tisulare, obstrucției și perforației.

Scopuri: 1. De a studia diversele profiluri clinice ale tuberculozei gastrointestinale la pacienții supuși laparotomiei; 2. De a studia patologia chirurgicală legată de tuberculoza gastro-intestinală; 3. De a studia diferitele modalități de tratament chirurgical pornind de la datele intraoperatorii și rezultatele acestora.

Rezultate: Acesta este un studiu prospectiv desfășurat pe parcursul a 12 luni la Institutul De Științe Medicale Himalaya, din Swami Ram Nagar, Dehradun. Acest studiu a fost efectuat pentru a evalua profilul clinico-patologic al tuberculozei intestinale supuse laparotomiei. Incidența tuberculozei gastrointestinale prezintă valorile cele mai ridicate în grupul de vârstă între 15 și 25 de ani, cu o predominanță în rândul sexului masculin. Forma cea mai frecventă de prezentare este obstrucția intestinală, aria ileocecală fiind cel mai adesea implicată, iar hemicolectomia dreaptă este procedura cel mai des efectuată. Alte patologii chirurgicale comun întâlnite au fost mase tumorale ileocecale și perforații ileale, de asemenea legate de tuberculoza pulmonară.

Concluzii: În ciuda antibioticelor antituberculoase specifice și ale măsurilor ample luate împotriva acestei boli, inclusiv chimioprofilaxia și pasteurizarea, tuberculoza intestinală rămâne o boală relativ frecvent întâlnită chiar și în zilele noastre. Tuberculoza gastrointestinală are o progresie indolentă, formele obișnuite de prezentare fiind cea subacută sau cea cronică. Explorarea chirurgicală promptă, îngrijirea postoperatorie vigilentă și administrarea de medicație antituberculoasă ajută la tratarea cu succes a pacienților, ducând la vindecarea completă și reabilitarea acestora.

Cuvinte cheie: tuberculoză gastrointestinală, laparotomie, obstrucție, perforație