

Miotomia endoscopică perorală versus miotomia Heller în achalazie: avantaje și dezavantaje

Cristian Tefas^{1,2}, Rami Ababneh¹, Marcel Tanțău^{1,2}

¹Gastroenterology Department, "Prof. Dr. Octavian Fodor" Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania

²"Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

Achalazia este o afecțiune motorie esofagiană ce cunoaște multiple metode de tratament endoscopic și chirurgical. Cu toate acestea nu există un consens referitor la terapia optimă la pacienții suferinzi de această afecțiune. Acest review discută două terapii cu concepte similare, dar mult diferite din punct de vedere tehnic, miotomia endoscopică perorală și miotomia chirurgicală Heller. După o scurtă introducere în problemele fundamentale ale achalaziei, sunt prezentate considerentele tehnice, complicațiile intra și postprocedurale și sunt discutate avantajele și dezavantajele celor două proceduri, pe baza articolelor relevante din literatura de specialitate. Miotomia chirurgicală Heller și miotomia endoscopică perorală par să prezinte eficiență similară, cu rezultate asemănătoare din punctul de vedere al ratelor de reflux gastroesofagian. Cu toate acestea, pe măsura câștigării experienței în domeniul miotomiei endoscopice, această procedură pare mai avantajoasă, cu rate similare de succes față de tehnica chirurgicală consacrată, dar oferind timpi operatori mai reduși, spitalizări mai scurte și în cele din urmă costuri mai mici.

Cuvinte cheie: achalazie, miotomie endoscopică perorală, miotomie Heller