

Ruptura spontană a anevrismul aortic abdominal după intervenția chirurgicală pentru hernie inghinală

Haldun Kar¹, Volkan Çakır², Hasan Fatih Tanyeli³, Salih Can Çelik¹, Özgün Akgül¹

¹Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey

²Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Radyology, Izmir, Turkey

³Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Izmir, Turkey

Rezumat

Anevismul aortic abdominal este un subtip rar de anevrism al arterelor viscerale. Acesta se clasifică în două categorii: anevismul adevărat și pseudoanevrismul. Pseudoanevrismul aortic abdominal, care apare după pancreatită, este întâlnit mai frecvent, în timp ce anevismul adevărat este rar întâlnit. Ruptura spontană poate fi fatală. Indiciile clinice cele mai importante sunt durere abdominală cu debut brusc și hipotensiunea. Intervențiile endovasculare sunt standardul de aur pentru acest diagnostic. Indiferent de mărimea lor, anevismele aortice abdominale trebuie tratate de urgență. La pacienții diagnosticați cu ruptură de anevrism aortic abdominal se recomandă embolizarea endovasculară dacă pacientul este stabil hemodinamic; în caz contrar, se recomandă tratament chirurgical. Rupturile de anevrism, în special în sfera aortei abdominale, sunt localizate adânc în parenchimul pancreatic, așadar sunt dificil de detectat în timpul intervenției chirurgicale. În aceste cazuri, existența unui diagnostic postoperator rapid în urma intervenției endovasculare cu embolizare poate salva viața pacientului. Scopul acestui studiu este de a prezenta un caz de ruptură de anevrism aortic abdominal, care cauzează șoc hemoragic după intervenția chirurgicală pentru hernie inghinală, diagnosticat prin intervenție endovasculară după explorare chirurgicală de urgență.

Cuvinte cheie: arteră aortică abdominală, anevrism, ruptură, embolizare endovasculară