

Indici ai supraviețuirii în rândul pacienților cu adenocarcinom pancreatic cu debut precoce.

Experiența unui centru medical de specialitate

Ahmad M. Alkashash¹, Maha AT Elsebaie², Mohamed H. Bikheth³, Mahmoud Morsi³, Ravi K. Paluri⁴

¹Department of Pathology, Indiana University, USA

²Department of Internal Medicine, John H. Stroger Hospital of Cook County, Chicago, USA

³Department of Surgery, University of Alabama in Birmingham, USA

⁴Department of Hematology and Oncology, University of Alabama in Birmingham, USA

Rezumat

Obiective: Descrierea caracteristicilor clinice ale pacienților cu adenocarcinom pancreatic cu debut precoce și analizarea factorilor prognostici care influențează supraviețuirea acestora.

Metode: Sinteza retrospectivă a 95 de pacienți, cu vârsta până în 45 de ani, inclusiv, care s-au prezentat la Spitalul Universitar din Alabama cu adenocarcinom pancreatic în perioada septembrie 1998-iunie 2018.

Rezultate: Durata medie de supraviețuire a fost de 12,9 luni pentru toți pacienții. Obezitatea, genul masculin, rasa și localizarea tumorii nu au fost asociate cu supraviețuirea. Fumatul în momentul stabilirii diagnosticului a determinat un risc de deces de trei ori mai mare (HR 3,05, IC 95% 1,45 – 6,40). Riscul de deces a scăzut cu 64% (HR 0,36, IC 95% 0,16 – 0,78) în cazul pacienților care au suferit o intervenție chirurgicală. Durata medie de supraviețuire a fost de 119,5 luni pentru pacienții aflați în stadiul I, 29,9 luni pentru cei aflați în stadiul II, 23,23 luni pentru cei aflați în stadiul III și 6,3 luni pentru cei aflați în stadiul IV. Efectul pozitiv al chimioterapiei asupra supraviețuirii a fost semnificativ doar în cazul asocierii cu FOLFIRINOX.

Concluzie: Anumiți factori prognostici care au fost stabiliți în cazul pacienților cu adenocarcinom pancreatic tipic nu au caracter predictiv în ceea ce privește supraviețuirea în rândul pacienților tineri. Fumatul, un factor de risc cunoscut pentru apariția adenocarcinomului pancreatic cu debut precoce, este totodată un indiciu semnificativ al supraviețuirii acestor pacienți. Eforturile de a îmbunătăți prognoza în cazul adenocarcinomului pancreatic cu debut precoce cuprind depistarea precoce, controlul tutunului, protocoalele de tratament personalizat și studierea comportamentului biologic.

Cuvinte cheie: adenocarcinom pancreatic, debut precoce, fumat, supraviețuire, intervenție chirurgicală