

Factorii de risc în dezvoltarea hematomului tecii rectale și a modalităților de tratament

Kubilay Dalci, Ahmet Gokhan Saritas, Ugur Topal, Erdi Aydin

Department of General Surgery, Cukurova University, Faculty of Medicine, 01330 Cukurova/Adana, Turkey

Rezumat

Context: În acest studiu, ne propunem să prezentăm caracteristicile clinice ale pacienților cu hematom în teacă rectală (RSH), precum și managementul terapeutic al stării și rezultatele.

Metode: Studiul a inclus pacienți care au fost diagnosticați și care au primit tratament pentru RSH spontană între anii 2010 și 2020. Caracteristicile demografice și clinice ale pacienților, precum și parametrii de urmărire, au fost analizate retrospectiv.

Rezultate: Studiul nostru a inclus 53 de pacienți. Numărul pacienților de sex feminin a fost de două ori mai mare decât numărul pacienților bărbați. Vârsta medie a fost de $65,7 \pm 14,68$ ani, iar 63,3% dintre pacienți aveau vârsta de peste 65 de ani. Cel mai frecvent anticoagulant utilizat a fost warfarina (30,1%), fiind cel mai des utilizat pentru bolile de inimă (54,7%). Valoarea raportului normalizat la momentul internării a fost de $1,93 \pm 1,18$, iar valoarea hemoglobinei a fost de 11,2 gr/dl. Diametrul mediu al hematomului a fost de 74 mm, iar cea mai frecventă etapă a fost tipul I (75,6%). Dintre pacienți, 90,6% au fost urmăriți conservator. Durata medie a spitalizării a fost de 15,1 zile, iar mortalitatea a apărut la opt pacienți în timpul spitalizării lor.

Concluzie: RSH spontan trebuie luat în considerare pentru femeile vârstnice care au utilizat anticoagulante. Majoritatea pacienților sunt urmăriți medical, dar mortalitatea este încă mare.

Cuvinte cheie: hematom de teacă de rect, durere abdominală, abordare conservatoare, terapie anticoagulantă, terapie chirurgicală, diagnostic