

RAJ vs RAFJ în cancerul rectal jos situat - rezultate postoperatorii - experiența unui singur centru

Paul Cristian Russu^{1,2}, Constantin Copotoiu¹, Cătălin Cosma², Vlad Olimpiu Butiurca^{1,2},
Călin Molnar^{1,2}

¹George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures,
Romania

²Department of Surgery, Emergency County Hospital, Targu Mures, Romania

Rezumat

Introducere: Managementul terapeutic al cancerului rectal recunoaște rezecția chirurgicală ca fiind pasul cel mai important pentru obținerea vindecării. Respectând principiile oncologice, preservarea funcțională reprezintă o prioritate pentru atingerea unei calități acceptabile a vieții acestor pacienți. Acest studiu își propune să compare rezultatele postoperatorii după rezecția rectală anterioară joasă (RAJ) cu cele după rezecția anterioară foarte joasă (RAFJ).

Material și metodă: Am realizat un studiu retrospectiv, observațional ce a inclus 147 de pacienți cu RAJ sau RAFJ realizate pentru cancere rectale joase în Clinica Chirurgie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, între ianuarie 2015 și decembrie 2019. Am considerat ca fiind cancere rectale joase acele tumori localizate între 5-10 cm de la marginea anală și foarte joase pe acelea situate sub 5 cm față de aceasta. Pacienții au fost împărțiți în două grupuri în funcție de tipul operației efectuate. Au fost urmărite rezultatele postoperatorii.

Rezultate: Cele două grupuri, RAJ cu 81 și RAFJ cu 66 de cazuri, au înregistrat o distribuție omogenă a parametrilor demografici și biologici și a caracteristicilor tumorale. O durată semnificativ mai mare ($p = 0,0223$) a intervenției chirurgicale s-a înregistrat în grupul cu RAFJ comparativ cu RAJ. Nu s-au identificat diferențe semnificative statistic între cele două grupuri privind morbiditatea și mortalitatea postoperatorie și nici durata de spitalizare.

Concluzii: Nu au fost diferențe statistice între rezultatele postoperatorii precoce obținute în grupurile RAJ și RAFJ. Cel mai important factor pentru obținerea unor bune rezultate oncologice și funcționale, în tratamentul cancerelor rectale joase este alegerea unui management chirurgical adecvat, individualizat, pentru fiecare pacient.

Cuvinte cheie: cancer rectal jos, preservare sfincteriană, rezecție rectală anterioară joasă, rezecție rectală anterioară foarte joasă