

### Rezumat

Cancerul mamar este a doua cea mai frecventă neoplazie care afectează femeile gravide. În literatura actuală există date limitate cu privire la opțiunile terapeutice pentru carcinomul ductal *in situ* (CDIS) în sarcină. Deoarece incidența cancerului mamar în sarcină este în creștere, această temă este de interes. În Statele Unite ale Americii una din 3000 de femei însărcinate este diagnosticată cu cancer mamar. Majoritatea femeilor cu CDIS sunt diagnosticate prin screening, deoarece acestea sunt asimptomatice. Întrucât screening-ul de rutină prin mamografie nu este recomandat în timpul sarcinii, diagnosticul de CDIS fără patologie invazivă este rar la femeile gravide. Cancerul mamar în sarcină reprezintă 0.2-3.8% din toate cazurile de cancer mamar nou diagnosticate. Această raportare nu diferențiază cazurile de CDIS de cele cu cancer mamar invaziv, astfel este dificil de stabilit adevărata

incidență a CDIS în sarcină. Acest review sintetizează recomandările multidisciplinare actuale privind tratamentul optim al CDIS diagnosticat în timpul sarcinii.

**Cuvinte cheie:** carcinomul ductal *in situ*, sarcina, diagnostic, tratament