

Impactul vârstei asupra rezultatelor postoperatorii după ligatură înaltă și strippingul venelor varicoase

Mihaela Pundiche^{1,2}, Nicoleta Leopa¹, Dragos Bajan¹, Iulia Cindea^{2,3}, Diana Iosif^{2,3}, Anca Chiso^{2,4}, Răzvan Cătălin Popescu^{1,2}

¹Department of General Surgery, Emergency Hospital of Constanța, Romania

²Ovidius University, Faculty of Medicine and Pharmacy Constanța, Romania

³Department of Anesthesiology, Emergency Hospital of Constanța, Romania

⁴Department of Pathology, Emergency Hospital of Constanța, Romania

Rezumat

Introducere: Boala varicoasă reprezintă o patologie cu un număr frecvent de cazuri care necesită tratament chirurgical. Ligatura înaltă a safenei și strippingul reprezintă încă o intervenție chirurgicală fezabilă în cazuri selecționate. Studiul de față are ca scop identificarea vârstei ca factor prognostic după ligatura înaltă și strippingul safenei.

Material și Metodă: Au fost analizate prospectiv cazurile pacienților internați în perioada 2016-2023 cu patologie varicoasă pentru care s-a practicat ligatura înaltă și strippingul safenei. 167 de pacienți au îndeplinit criteriile de includere și de excludere, fiind divizați în două grupuri: Grupul I – 114 pacienți cu vârsta sub 60 de ani și Grupul II – 53 pacienți cu vârsta de peste 60 de ani. Pacienții au fost urmăriți în perioada postoperatorie la 1 lună și respectiv 6 luni, iar datele au fost colectate utilizând mai multe chestionare: CEAP, VAS, VCSS și AVVQ.

Rezultate: Clasa 4, conform clasificării CEAP a fost cel mai frecvent implicată indiferent de categoria de vârstă (Grupul I: 49,12%, Grupul II: 49,06%), urmată de clasa 2 (Grupul I: 41,22%, Grupul II: 35,85). În perioada preoperatorie au existat diferențe statistic semnificative între cele două grupuri în ceea ce privește VAS ($p = 0,041$) și AVVQ (Grupul I: $12,51 \pm 6,11$, Grupul II: $11,11 \pm 7,19$, $p = 0,036$). Nu au existat diferențe semnificativ statistice între cele două grupuri ($p = 0,744$) privind chestionarul VCSS efectuat preoperator. La 6 luni după intervenția chirurgicală, îmbunătățirea VCSS și AVVQ a fost independentă de vârstă.

Concluzii: Intervenția chirurgicală de ligatura înaltă și stripping al safenei este o operație sigură și fezabilă ce se poate efectua în cazuri selecționate care nu este influențată de vârsta pacienților.

Cuvinte cheie: vârsta, chirurgie, ligatură înaltă a safenei, stripping, varice