

Anastomoza perichisto-digestivă în chisturile hidatice hepatice: indicații, rezultate și algoritm decizional chirurgical

Stere Popescu^{1,2,3}, Tina Popescu⁴, Bogdan Obada^{2,5}, Teodor Ștefan Nițu^{1,2}, Irina Nițu^{1,2}, Maria Sabina Neacșu^{1,2}, Ana Maria Grigorescu^{1,2}, Florin Gabriel Pănculescu², Florin Daniel Enache^{2,6}, Mihai Victor Lupașcu², Iulian Manac^{2,6}, Daniel Ovidiu Costea^{1,2}

¹Department of General Surgery, Emergency Hospital of Constanța, Romania

²Ovidius University, Faculty of Medicine and Pharmacy, Constanța, Romania

³Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ovidius University, Constanța, Romania

⁴Hospital Pharmacy, Emergency Hospital of Constanța, Romania

⁵Department of Orthopedics and Traumatology, Emergency Hospital of Constanța, Romania

⁶Department of Pediatric Surgery and Pediatric Orthopedics, Emergency Hospital of Constanța, Romania

Rezumat

Introducere: Anastomoza perichisto-digestivă este o opțiune chirurgicală rar utilizată, dar valoroasă, în tratamentul chistului hidatic hepatic complicat.

Material și metodă: Studiul retrospectiv a inclus 24 de pacienți operați între 2010 și 2023 într-un centru de chirurgie generală din România. Au fost analizate indicațiile intraoperatorii, tipurile de anastomoză efectuate și evoluția postoperatorie.

Rezultate: Anastomoza perichisto-jejunală în Y a fost utilizată la 19 pacienți, iar perichistogastrostomia la 5. Toți pacienții prezentau fistulă biliară comunicantă intraoperator (≥ 5 mm). Nu au existat decese sau reintervenții. Complicațiile minore au inclus sindrom febril tranzitoriu (12,5%), întârzierea tranzitului intestinal (8,3%) și o colecție subhepatică drenată percutanat (4,1%). Imagistica de urmărire a arătat regresia progresivă a cavităților restante.

Concluzii: Anastomoza perichisto-digestivă poate fi o soluție sigură și eficientă în cazuri atent selecționate, cu chisturi mari, centrale, cu fistule biliare și perichist bine organizat. Pe baza experienței clinice și a literaturii actuale, propunem un algoritm decizional practic pentru orientarea indicației chirurgicale în echinococoză hepatică complicată.

Cuvinte cheie: chist hidatic hepatic, anastomoză perichisto-digestivă, fistulă biliară, jejunostomie Roux-en-Y, tratament chirurgical, selecția cazurilor, algoritm decizional