

**Prezentare rară a carcinomului mamar accesoriu sincron în peretele abdominal
- raport de caz și o trecere în revistă a literaturii de specialitate**

Fatima Arab^{1,2,3}, Tessa Walton³, Caroline Brodie⁴, Michaela Larkin⁴, Aoife Lowery^{3,5}

¹Royal College of Surgeons of Ireland, Dublin, Ireland

²Department of Surgery, Faculty of Medicine, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia

³Department of Surgery, Galway University Hospital, Galway, Ireland

⁴Histopathology Department, Galway University Hospital, Galway, Ireland

⁵Department of Surgery, The Lambe Institute for Translational Research,
National University of Ireland, Galway, Ireland

Rezumat

Malignitatea primară în țesutul mamar accesoriu este un diagnostic rar, reprezentând mai puțin de 1% din totalul cancerelor de sân și se prezintă cel mai frecvent cu o masă palpabilă la nivelul axilei. În plus, un al doilea cancer mamar primar concomitent, găsit în țesutul mamar accesoriu, este un fenomen extrem de rar, deși rapoartele despre acestea sunt în creștere. Locurile extramamare în care au fost raportate tumori maligne mamare primare secundare includ pliul inframamar, abdomenul și chiar vulva. Atunci când se suspectează o malignitate mamară ectopică, evaluarea triplă este abordarea standard a investigației. Cu toate acestea, nu există ghiduri specifice de tratament și, prin urmare, se respectă aceleași ghiduri ca și în cazul cancerului mamar pectoral. Aici, prezentăm un raport despre o femeie în vârstă de 71 de ani, tratată pentru un cancer mamar stâng, diagnosticată cu un al doilea carcinom mamar primar concomitent în cadranul superior drept al peretelui abdominal, care a fost tratat chirurgical cu excizie locală largă și biopsie a ganglionului limfatic sentinelă. Acest caz evidențiază importanța menținerii unui indice ridicat de suspiciune în timpul evaluării acestor pacienți pentru a stabili diagnosticul corect într-un stadiu incipient.

Cuvinte cheie: sân accesoriu, tumoră a peretelui abdominal, axilă, cancer mamar